

Biodiversiteit in strokenteelt




1 Algemeen

Elk gewas heeft een eigen gemeenschap aan insecten, akkerflora en broedende akkervogels. Hoe meer gewassen er op één veld staan, hoe meer biodiversiteit er te vinden is.



2 Vogels: foerageren




Afwisseling van broed- en foerageergewassen op één veld zorgt voor een aantrekkelijke leefomgeving en kortere vliegafstanden



3 Vogels: schuilen

Afwisseling van hoge en lage gewassen biedt de mogelijkheid voor vogels om zowel te foerageren als te kunnen schuilen voor predatoren



4 Zoogdieren

Zoogdieren zoals hazen en muizen nemen toe in strokenteelt. Hoewel dit gewasschade kan veroorzaken, helpt het ook bedreigde roofvogelsoorten van voedsel te voorzien.




5 Insecten: voedsel

Veel nuttige insecten leven van zowel nectar als plaaginsecten. Door strokenteelt kunnen beide voedselbronnen dicht bij elkaar aanwezig zijn.



6 Insecten: migreren

Als er in de ene strook grondbewerkingen plaatsvinden, kunnen insecten hun toevlucht zoeken in de naburige stroken.



7 Akkerflora

De randen tussen de stroken bevatten over het algemeen meer akkerflora. Deze akkerflora is weer leefgebied voor insecten.

